et, à l'extrémité de l'abdomen, se voient deux pointes chitineuses brunes destinées à faciliter les mouvements dans la loge.

Sur la collaboration de Creutzer et de Zenker à l'œuvre de Panzer [Col.]

par A. Méquignon.

Dans l'ouvrage de Panzer, *Faunae Insectorum germanicae Initia*, quelques descriptions sont signées d'un C. ou d'un Z. Ces initiales désignent Creutzer ou Zenker, comme le prouvent les planches où se lit en entier le nom de ces deux entomologistes, et ce sont eux qu'il faut considérer, à l'exclusion de Panzer, comme étant respectivement les auteurs de ces diagnoses (1).

En effet on trouve, par exemple, un Z. après la description de l'*Helops sericeus*, fasc. 73, p. 10; mais on lit ensuite une remarque signée d'un P., par laquelle Panzer indique qu'il ne partage pas l'avis de Zenker et que l'espèce décrite sous le nom d'*Helops* doit rentrer dans le genre récent *Ptomaphagus*. Ailleurs, fasc. 73, p. 5, pour le *Dromius quadrinotatus*, les deux premiers paragraphes se terminent chacun par un Z. et le troisième par un P. Ainsi Panzer, respectant les opinions de ses collaborateurs, leur en laissait la responsabilité, et, selon un usage fort répandu à cette époque, ces initiales constituaient une véritable signature. Le fascicule 35 notamment doit être, pour ce motif, attribué tout entier à Creutzer.

Or cette particularité avait jusqu'ici échappé aux auteurs qui ont faussement attribué ces espèces à Panzer. Elle m'a été obligeamment indiquée par M. Louis Bedel, dont la science et l'expérience m'ont été d'un grand secours dans l'établissement de ces notes rectificatives et synonymiques.

Je n'ai fait ce relevé que pour les Coléoptères ainsi décrits (2), et je les énumère dans l'ordre du *Catalogus Coleopterorum* de Reitter, 1906; on devra pour ceux-ci modifier le nom d'auteur et, au lieu de Panzer, lire Creutzer (ou Zenker) apud Panzer.

(1) Au contraire, il n'y a pas à tenir compte des noms figurant sur les planches et dans le titre des diagnoses, lorsque celles-ci ne sont pas suivies d'une initiale : ce sont des noms *in litteris*, conservés par Panzer à des insectes qu'on lui avait adressés, mais dont il rédige lui-même la description.

(2) Le même travail reste à faire pour tous les autres ordres.

**

1. Espèces décrites comme nouvelles par Creutzer.

Lestera dimidiata, 1796, fasc. 36, p. 3 = *longelytrata* Goeze.
Staphylinus chloropterus, 1796, 36, 20.
Quedius impressus, 1796, 36, 21 = *cinctus* Payk.
Cantharis bicolor, 1797, 39, 13 (1) = *pallida* Goeze.
Rhagonycha melanocephala, 1797, 39, 12 (2) = *lutea* Müller.
Oxylaemus cylindricus, 1796, 35, 18.
Rhizobius aurora, 1796, 36, 5 = *litura* Fabr.
Lithophilus connatus, 1796, 36, 18 (3).
Globicornis rufitarsis, 1796, 35, 6 = *nigripes* Fabr.
Orphilus glaber, 1796, 35, 11 = *niger* Rossi.
Coroebus (4) *sinuatus*, 1796, 35, 13 (*lampsanae* Bon.).
Anobium denticolle, 1796, 35, 8.
Xyletinus ater, 1796, 35, 9.
Hylophilus populneus, 1796, 35, 4.
Hylophilus melanocephalus, 1796, 35, 5 = *pygmaeus* De Geer.
Anthicus hirtellus, 1796, 35, 3 = *hispidus* Rossi.
Mordellistena neuwaldeggiana, 1796, 36, 8.
Crypticus laticollis, 1796, 36, 1 = *quisquilius* L.
Agapanthia micans, 1796, 35, 14 = *violacea* Fabr.
Phytoecia bipunctata, 1796, 35, 16 = *affinis* Harrer.
Phytoecia flavimana, 1796, 35, 15 = *rufimana* Schrank.
Pachnephorus arenarius, 1797, 39, 19 = *pilosus* Rossi.
Cassida pulchella, 1797, 39, 15 (5) = *nobilis* L.
Pleurophorus caesus. 1796, 35, 2.
Aphodius anachoreta, 1796, 35, 1 = *porcus* Fabr.

(1) La référence du Catalogue de Reitter est à corriger.

(2) Le catalogue de Gemminger et Harold cite par erreur le fascicule 33 pour cette espèce, et Bourgeois, Faune gallo-rhénane IV, p. 141, trompé sur la tomaison, donne à tort la date de 1792.

(3) Le tome 36 de Panzer est de 1796, et non de 1797, comme l'indique, pour cette espèce, Reitter, Cat. Col., 1906, p. 370.

(4) Et non *Coraebus*, comme l'écrit Reitter, Cat. Col. 1906, p. 417, l'étymologie étant Κόροιβος, nom propre. Pour la synonymie, voir plus bas, p. 120.

(5) Reitter, Cat. Col., 1906, p. 585, écrit 1839, 15 pour 1797, 39, 15.

II. Espèces déjà connues redécrites par Creutzer sous le même nom.

Homalisus suturalis Ol., 1790; Creutz. ap. Panz., 1796, 35, 12 = *fontisbellaquei* Geoffr., 1785.

Amphotis biloba Herbst, 1793; Creutz. ap. Panz., 1796, 35, 10 = *marginata* Fabr., 1781.

Hendecatomus reticulatus Herbst, 1793; Creutz. ap. Panz., 1796, 35, 7. — Creutzer ne cite pas Herbst.

Cyrtegetis impunctata L., 1767; Creutz. ap. Panz., 1796, 36, 4.

Sinoxylon muricatum ♀ Fabr., 1792; Creutz. ap. Panz., 1796, 35, 17 = *perforans* Schrank, 1789.

III. Espèces décrites comme nouvelles par Zenker.

Bembidion (*Peryphus*) *decorum*, 1801, 73, 4.

Ophonus chlorophanus, 1801, 73, 3 = *azureus* Fabr.

Agonum pavidum, 1801, 73, 7 = *ruficorne* Goeze.

Dromius quadrinotatus, 1801, 73, 5.

Ptomaphagus sericeus, 1801, 73, 10 = *subrillosus* Goeze.

Aphodius tristis, 1801, 73, 1.

Synonymies de Coléoptères paléarctiques

par A. Méquignon.

Liodes picea Illig., 1798 (1), Käf. Preuss., 75 = *picea* Panz., 1797, Fn. germ., 37, 8.

Cryptopleurum crenatum Panz., 1794, Fn. germ., 23, 3 = *crenatum* Kugel., 1794, ap. Schneid. Mag., 543. — Panzer cite Kugelann dont l'ouvrage a l'antériorité.

Porcinolus murinus Fabr., 1794, Ent. syst. IV, 437, a été décrit la même année par Illiger, ap. Schneid. Mag., 593; les *types* des deux auteurs proviennent d'Hellwig.

(1) Reitter, Cat. Col., 1906, p. 251, donne par erreur 1898. Plus loin p. 253, pour l'*Anisotoma glabra* Kugel. au lieu de p. 148, lire p. 538.